

# Liste der Vorkommen besonderer Pflanzenarten in MuttENZ

Die nachfolgende Liste enthält botanische Besonderheiten der Gemeinde MuttENZ. Sie erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sollte aber die wichtigsten Arten abdecken. Die grössten Lücken bestehen vermutlich bei den Arten ruderaler Standorte. Bei den mageren Wiesen sind auch Arten berücksichtigt, die noch etwas weiter verbreitet sind (z.B. Salbei und Knolliger Hahnenfuss). Fundorte werden nur bei seltenen Arten mit ganz wenigen Vorkommen genannt.

Bedeutung der Tabellenspalten:

RL CH, RL ML, RL JU: Gefährdungsstatus gemäss Roter Liste der gefährdeten Farn- und Blütenpflanzen der Schweiz (Moser et al., 2002) für die gesamte Schweiz (CH), die Region Mittelland (ML) und die Region Jura (JU): LC = nicht gefährdet, VU = verletzlich, EN = stark gefährdet, CR = vom Aussterben bedroht, NT = potenziell gefährdet. Die Gemeinde MuttENZ gehört gemäss Roter Liste trotz ihres grossen Juraanteils der Region Mittelland an.

§ BL: Die mit \* markierten Arten sind im Kanton Baselland gesetzlich geschützt.

Wissenschaftlicher Name	Deutscher Name	RL CH	RL ML	RL JU	§ BL	Fundorte seltener Arten
Aceras anthropophorum	Ohnsporn	VU	VU	VU	*	Sulzgrube (ob noch?)
Acinos arvensis	Feld-Steinquendel	LC	LC	LC		Sulzgrube, Rangierbhf. Auhafen
Adoxa moschatellina	Moschuskraut	LC	LC	LC		Laahallen, Hard, Birsufer
Agrimmonia eupatoria	Gemeiner Odermennig	LC	LC	LC		
Anacamptis pyramidalis	Spitzorchis	NT	VU	NT	*	Magerwiesen Rütihardhof
Anemone ranunculoides	Gelbes Windröschen	LC	LC	LC	*	Birsufer
Angelica sylvestris	Brustwurz	LC	LC	LC		z.B. Eselhallen
Anthyllis vulneraria s.l.	Karpaten-Wundklee	LC	LC	LC		Sulzgrube
Aquilegia vulgaris	Gemeine Akelei	LC	LC	LC		
Arabis hirsuta s.str.	Rauhe Gänsekresse	LC	LC	LC		Sulzgrube
Asperula cynanchica	Hügel-Waldmeister	LC	NT	LC		Vordere Ruine
Briza media	Gemeines Zittergras	LC	LC	LC		
Bromus erectus	Aufrechte Trespe	LC	LC	LC		
Bupleurum falcatum	Sichelblättriges Hasenohr	LC	VU	LC		Vordere Ruine
Caltha palustris	Sumpf-Dotterblume	LC	LC	LC		z.B. Eselhallen

Autor I Bi Hintermann & Weber AG, Hauptstrasse 52, CH-4153 1/4  
 n: Reinach  
 PL/G We Freigabe Bi Datum: 24.12.2005 Telefon 061 717 88 82, Telefax 061 717 88 89  
 L: :  
 Referen 568 Liste Pflanzen birrer@hintermannweber.ch  
 z:  
 Verteile - Büros in Reinach BL, Bern, Montreux, Rodersdorf  
 r:

Campanula persicifolia	Pfirsichblättrige Glockenblume	LC	NT	LC	*	Wartenberg
Carex caryophyllea	Frühlings-Segge	LC	LC	LC		
Carex montana	Berg-Segge	LC	LC	LC		
Carlina vulgaris	Gold-Distel	LC	NT	LC		Sulzgrube
Centaurea jacea	Gewöhnliche Wiesenflockenblume	LC	LC	LC		
Cephalanthera damasonium	Weisses Waldvögelein	LC	LC	LC	*	u.a. Wartenberg, Sulzchopf
Cephalanthera longifolia	Langblättriges Waldvögelein	LC	NT	LC	*	u.a. Wartenberg, Sulzchopf
Cephalanthera rubra	Rotess Waldvögelein	LC	NT	LC	*	u.a. Wartenberg, Sulzchopf
Cirsium oleraceum	Kohldistel	LC	LC	LC		z.B. Eselhallen
Cirsium palustre	Sumpf-Kratzdistel	LC	LC	LC		z.B. Eselhallen
Clinopodium vulgare	Wirbeldost	LC	LC	LC		
Colchicum autumnalis	Herbstzeitlose	LC	LC	LC		
Crepis foetida	Stinkender Pippau	VU	EN	EN		Kiesgrube Chlingental
Dactylis polygama	Aschersons Knäuelgras	VU	VU	VU		v.a. Hardwald
Dactylorhiza fuchsii	Fuchs' Knabenkraut	LC	LC	LC		Magerwiesen Rütihardhof
Daphne mezereum	Gemeiner Seidelbast	LC	LC	LC	*	
Dipsacus pilosus	Behaarte Karde	VU	VU	VU		v.a. im Bereich Sulzchopf - Chlosterchöpfli
Epilobium dodonei	Rosmarin- Weidenröschen	LC	VU	NT		v.a. Bahnanlagen und Kiesgrube Chlingental
Epipactis atrorubens	Braunrote Sumpfwurz	LC	NT	LC		Sulzgrube
Euphorbia cyparissias	Zypressen-Wolfsmilch	LC	LC	LC		
Euphorbia verrucosa	Warzige Wolfsmilch	LC	NT	LC		
Festuca ovina agg.	Schaf-Schwingel	LC	LC	LC		
Filipendula ulmaria	Moor-Geissbart	LC	LC	LC		z.B. Eselhallen
Gentiana ciliata	Gefranster Enzian	LC	VU	LC	*	Sulzgrube
Goodyera repens	Moosorchis	LC	CR	NT	*	Sulzgrube
Gymnadenia conopsea	Mücken-Händelwurz	LC	LC	LC	*	
Helianthemum nummularium s.l.	Gemeines Sonnenröschen	LC	NT	LC		Vordere Ruine
Helictotrichon pubescens	Flaum-Wiesenhafer	LC	LC	LC		
Hieracium pilosella	Langhaariges Habichtskraut	LC	LC	LC		
Hieracium piloselloides	Florentiner Habichtskraut	LC	NT	LC		
Hippocrepis comosa	Hufeisenklee	LC	LC	LC		Sulzgrube, Vordere Ruine
Ilex aquifolium	Stechpalme	LC	LC	LC	*	
Inula conyza	Dürrwurz-Alant	LC	NT	LC		
Inula salicina	Weiden-Alant	NT	NT	NT	*	
Knautia arvensis	Feld-Witwenblume	LC	LC	LC		
Lilium martagon	Türkenbund	LC	NT	LC	*	u.a. Wartenberg, Sulzchopf
Linum catharticum	Purgier-Lein	LC	LC	LC		
Listera ovata	Grosses Zweiblatt	LC	LC	LC	*	
Luzula campestris	Feld-Hainsimse	LC	LC	LC		
Lythrum salicaria	Blut-Weiderich	LC	LC	LC		Eselhallen
Muscari racemosum	Traubige Bisamhyazinthe	NT	NT	NT		Reben und Wiesen am Wartenberg
Neottia nidus-avis	Nestwurz	LC	LC	LC	*	

<i>Onobrychis viciifolia</i>	Saat-Esparsette	LC	LC	LC		
<i>Ononis repens</i>	Kriechende Hauhechel	LC	LC	LC		
<i>Ophrys apifera</i>	Bienen-Ragwurz	VU	VU	VU	*	Magerwiesen Rütihardhof
<i>Orchis mascula</i>	Männliches Knabenkraut	LC	NT	LC	*	Sulzgrube
<i>Orchis militaris</i>	Helm-Knabenkraut	NT	VU	NT	*	Sulzgrube
<i>Origanum vulgare</i>	Dost	LC	LC	LC		
<i>Ornithogalum umbellatum</i>	Doldiger Milchstern	LC	LC	LC	*	Wartenberg
<i>Petrorhagia prolifera</i>	Sprossende Felsennelke	LC	NT	NT		Auhafen
<i>Peucedanum cervaria</i>	Hirschwurz	LC	NT	LC		Magerweide Zinggibrunn
<i>Phyllitis scolopendrium</i>	Hirschzunge	LC	NT	LC	*	
<i>Pimpinella saxifraga</i>	Kleine Bibernelle	LC	LC	LC		Sulzgrube
<i>Platanthera bifolia</i>	Weisses Breitkölbchen	LC	NT	LC	*	Sulzgrube
<i>Polygala amarella</i>	Bittere Kreuzblume	LC	LC	LC		Sulzgrube
<i>Polygonatum odoratum</i>	Echtes Salomonssiegel	LC	VU	LC		Sulzgrube
<i>Potentilla neumanniana</i>	Frühlings-Fingerkraut	LC	LC	LC		Magerwiesen Rütihardhof
<i>Primula veris</i>	Frühlings-Schlüsselblume	LC	LC	LC		
<i>Ranunculus bulbosus</i>	Knolliger Hahnenfuss	LC	LC	LC		
<i>Rhamnus alpina</i>	Alpen-Kreuzdorn	LC	EN	LC		Sulzgrube
<i>Salvia pratensis</i>	Wiesen-Salbei	LC		LC		
<i>Sanguisorba minor</i>	Kleiner Wiesenknopf	LC	LC	LC		
<i>Scabiosa columbaria</i>	Gemeine Sbabiose	LC	LC	LC		Sulzgrube, Rütihardhof
<i>Scilla bifolia</i>	Zweiblättriger Blaustern	LC	LC	LC	*	v.a. Hardwald und Rütihard
<i>Scrophularia canina</i>	Hunds-Braunwurz	LC	EN	EN		Kiesgrube Chlingental
<i>Securigera varia</i>	Bunte Kronwicke	LC	NT	LC		
<i>Sedum album</i>	Weisser Mauerpfeffer	LC	LC	LC		u.a. Rangierbhf. Auhafen, Sulzgrube
<i>Sedum sexangulare</i>	Milder Mauerpfeffer	LC	LC	LC		
<i>Sherardia arvensis</i>	Ackerröte	LC	LC	LC		Asprain
<i>Stachys officinalis</i>	Gebrauchliche Betonie	LC	LC	LC		Magerwiesen Rütihardhof
<i>Stachys recta</i>	Aufrechter Ziest	LC	NT	LC		Vordere Ruine
<i>Staphylea pinnata</i>	Pimpernuss	VU	EN	VU	*	Wartenberg, Sulzchopf (ob noch?)
<i>Stellaria holostea</i>	Grossblumige Sternmiere	VU	VU	VU		Hardwald
<i>Tanacetum corymbosum</i>	Straussblütige Margerite	NT	NT	NT	*	Wartenberg W-Hang
<i>Thalictrum aquilegiifolium</i>	Akeleiblättrige Wiesenraute	LC	NT	LC	*	Magerwiesen Rütihardhof
<i>Thlaspi montanum</i>	Berg-Täschelkraut	LC	VU	LC		Wartenberg W-Hang
<i>Thymus pulegioides</i>	Arznei-Thymian	LC	LC	LC		u.a. Rütihardhof, Asprain, Auhafen
<i>Torilis arvensis</i>	Feld-Borstendolde	VU	EN	EN		Reben im Bereich Schutzhütte
<i>Tragopogon orientalis</i>	Östlicher Wiesenbocksbart	LC	LC	LC		z.B. Magerwiesen Rütihardhof
<i>Trifolium medium</i>	Mittlerer Klee	LC	LC	LC		z.B. Magerweide Zinggibrunn

<i>Tulipa sylvestris</i>	Weinberg-Tulpe	EN	EN	EN	*	Reben, Wiesen, Gebüsche und Gärten am Wartenberg
<i>Valerianella carinata</i>	Gekielter Ackersalat	LC	NT	NT		Reben Wartenberg
<i>Veronica polita</i>	Glänzender Ehrenpreis	LC	NT	LC		v.a. Reben Wartenberg
<i>Veronica teucrium</i>	Grosser Ehrenpreis	LC	VU	LC		Vordere Ruine

---